

1.	Record Nr.	UNINA990001077600403321
	Autore	Wilder, Raymond Louis <1896- >
	Titolo	Introduction to the Foundations of Mathematics / Raymond L. Wilder
	Pubbl/distr/stampa	New York ; London : John Wiley : Chapman & Hall, 1956
	Edizione	[2nd printing]
	Descrizione fisica	xiv, 305 p. ; 24 cm
	Disciplina	519
	Locazione	FI1
	Collocazione	4A-103
	Lingua di pubblicazione	Inglese
	Formato	Materiale a stampa
	Livello bibliografico	Monografia
2.	Record Nr.	UNINA9910454397603321
	Titolo	International collation of traditional and folk medicine . Volume 4 Northeast Asia . Part IV [[electronic resource] /] / Editors, Takeatsu Kimura, Paul P.H. But, Chung Ki Sung
	Pubbl/distr/stampa	Singapore ; ; River Edge, N.J., : World Scientific, 2001
	ISBN	1-281-95186-2 9786611951863 981-281-035-8
	Descrizione fisica	1 online resource (227 p.)
	Collana	International Collation of Traditional and Folk Medicine
	Altri autori (Persone)	KimuraTakeatsu ButPaul P. H SungChung Ki
	Disciplina	615.882
	Soggetti	Materia medica, Vegetable - East Asia Medicinal plants - East Asia Traditional medicine - East Asia Electronic books.
	Lingua di pubblicazione	Inglese
	Formato	Materiale a stampa

Livello bibliografico	Monografia
Note generali	"A project of UNESCO."
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references and indexes.
Nota di contenuto	FOREWORD; CONTENTS; EXPLANATIONS AND ABBREVIATIONS; PLANT; <i>Sargassum pallidum</i> (Turn.) C. Ag. (Sargassaceae); <i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm. (Polypodiaceae); <i>Pinus koraiensis</i> S. et Z. (Pinaceae); <i>Gnetum parvifolium</i> (Warb.) C.Y. Cheng ex Chun (Gnetaceae); <i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steudel (Betulaceae); <i>Cudrania cochinchinensis</i> (Lour.) Kud. & Masam. (Moraceae); <i>Ficus religiosa</i> L. (Moraceae); <i>Viscum coloratum</i> (Komar.) Nakai (Loranthaceae); <i>Fagopyrum cymosum</i> Meisn. (Polygonaceae); <i>Rumex acetosa</i> L (Polygonaceae); <i>Drymaria diandra</i> Blume (Caryophyllaceae) <i>Polycarpaea coiymbosa</i> Lam . (Caryophyllaceae)<i>Vaccaria segetalis</i> (Neck.) Garcke (Caryophyllaceae); <i>Chenopodium ambrosioides</i> L. (Chenopodiaceae); <i>Spinacia oleracea</i> L. (Chenopodiaceae); <i>Gomphrena globosa</i> L. (Amarantaceae); <i>Magnolia coco</i> (Lour.) DC. (Magnoliaceae); <i>Desmos chinensis</i> Lour. (Annonaceae); <i>Laurus nobilis</i> L. (Lauraceae); <i>Adonis amurensis</i> Reg. et. Radd. (Ranunculaceae); <i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehd. et Wils. (Lardizabalaceae); <i>Stauntonia chinensis</i> DC. (Lardizabalaceae); <i>Diploclisia glaucescens</i> (Blume)Diels (Menispermaceae); <i>Stephaniajaponica</i> (Thunb.) Miers (Menispermaceae) <i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill. (Saururaceae)<i>Dryobalanops aromatica</i> Gaertn. f. (Dipterocarpaceae); <i>Brassica alba</i> (L.) Boiss (Cruciferae); <i>Loropetalum chinensis</i> (R. Brown) Oliv. (Hamamelidaceae); <i>Fragaria chiloensis</i> Duchartre var. <i>ananassa</i> Bailey (Rosaceae); <i>Prunus tomentosa</i> Thunb. (Rosaceae); <i>Spiraea prunifolia</i> Sieb. et Zucc. var. <i>simpliciflora</i> Nakai (Rosaceae); <i>Acacia catechu</i> (L.) Willd. (Leguminosae); <i>Cassia angustifolia</i> Vahl (Leguminosae); <i>Dalbergia odorifera</i> T.Chen (Leguminosae); <i>Desmodium styracifolium</i> (Osborne) Merr. (Leguminosae); <i>Dolichos lablab</i> L. (Leguminosae) <i>Entada phaseoloides</i> (L.) Merr. (Leguminosae)<i>Mucuna birdwoodiana</i> Tutch. (Leguminosae); <i>Trifolium repense</i> L. (Leguminosae); <i>Robinia pseudo-acacia</i> L. (Leguminosae); <i>Oxalis corniculata</i> L. (Oxalidaceae); <i>Erodium stephanianum</i> Willd. (Geraniaceae); <i>Tribulus terrestris</i> L. (Zygophyllaceae); <i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd. (Euphorbiaceae); <i>Euphorbia sieboldiana</i> Morr. et Decne. (Euphorbiaceae); <i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd. (Euphorbiaceae); <i>Citrus junos</i> Sieb. (Rutaceae); <i>Ruta graveolens</i> L. (Rutaceae); <i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. et Zucc. (Rutaceae) <i>Zanthoxylum schinifolium</i> Sieb. et Zucc. (Rutaceae)<i>Boswellia carterii</i> Birdwood (Burseraceae); <i>Canarium album</i> Raeusch. (Bruseraceae); <i>Commiphora molmol</i> Engl. (Burseraceae); <i>Cedrela sinensis</i> Tuss (Meliaceae); <i>Acer ginnala</i> Max. (Aceraceae); <i>Dimocarpus longan</i> Lour. (Sapindaceae); <i>Euonymus japonica</i> Thunb. (Celastraceae); <i>Euonymus sieboldianus</i> Blume (Celastraceae); <i>Cayratiajaponica</i> Gagn. (Vitaceae); <i>Vitis amurensis</i> Rupr. (Vitaceae); <i>Vitis vinifera</i> L. (Vitaceae); <i>Corchorus acutangulus</i> Lam. (Tiliaceae); <i>Hibiscus manihot</i> L. (Malvaceae); <i>Firmianaplatanifolia</i> Schott. et Endl. (Sterculiaceae) <i>Sterculia lychnophora</i> Hance (Sterculiaceae)
Sommario/riassunto	Traditional folk medicine practices in China, Hong Kong, Japan and Korea - all located in Northeast Asia - are comparable. Since different usage of a folk medicine may reflect cultural or regional differences, a detailed collation of the folk knowledge of traditional medicine can help to identify common applications derived from different empirical knowledge as well as variations in appreciation of the value of the same source in different cultural settings. The fourth volume of this book series continues with the objective of collating relevant information for

showing the differences and simi
